

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

滋 養 強 壮 剤

第3類医薬品

キョーレオピンキャプレット

製品の特徴

キョーレオピンキャプレット4は、ニンニクを長期間かけ抽出・熟成し、濃縮して得られた濃縮熟成ニンニク抽出液に、肝臓分解エキスを配合した滋養強壮剤です。

本剤は、表面にコーティングをほどこしてありますので、ニンニクや肝臓分解エキス特有の味やにおいは気になりません。のみやすいカプセル形の錠剤(キャプレット)で、8才以上のお子様、妊娠授乳期の方にも服用いただけます。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

大人(15才以上)の場合

- 滋養強壮
- 虚弱体質
- 肉体疲労・病後の体力低下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

8才以上15才未満の場合

- 滋養強壮
- 虚弱体質
- 偏食児・小児の発育期・病後の体力低下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

用法・用量

下記量を水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	1 錠	2 回
8才以上15才未満	1 錠	1 回
8才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(裏面へつづく)

成分とはたらき

成 分	分量 (2錠中)	は た ら き
濃縮熟成 ニンニク抽出液	0.9mL	ニンニクの鱗茎を長期間かけ抽出・熟成し、濃縮して得られた抽出液で、ニンニク特有の刺激やにおいはほとんどなく、虚弱体質や肉体疲労時などにすぐれた滋養強壮効果を発揮します。
肝臓分解エキス	100mg	酵素分解した肝臓から抽出したエキスで、必須アミノ酸などの栄養素を含み、虚弱体質や栄養障害時などの場合に滋養強壮作用をあらわします。
パントテン酸 カルシウム	20mg	脂肪や炭水化物のエネルギー代謝に必要なビタミンで、肉体疲労時や胃腸障害、栄養障害時などの場合の不足を補います。
ビタミンB ₁ 塩酸塩	20mg	体内のエネルギー産生回路に必要な栄養素の一つで、肉体疲労時や病後の体力低下時などの場合の不足を補います。
ビタミンB ₁₂	50μg	胃腸障害や栄養障害時などの場合の不足を補います。

添加物として、タルク、セルロース、ケイ酸Ca、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、含水二酸化ケイ素、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、マクロゴール、トリアセチン、酸化チタン、三二酸化鉄、ヒプロメロース、カルナウバロウを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 錠剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5) ぬれた錠剤はボトルに戻さないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (7) ボトルの詰め物は、輸送中の内容物の破損を防ぐためのものです。開封後は不要となりますので、取りのぞいてください。

《販売名》キヨーレオピンキャプレット4

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎ 0570-666-170

受付時間 9時～12時、13時～17時（土、日、祝日を除く）

製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

<https://www.wakunaga.co.jp/>